

Alla cortese attenzione dei sanitari addetti all'effettuazione dei Tamponi COVID 19

Oggetto: Tampone Rino Faringeo: rischio epistassi nel Paziente affetto da Teleangectasia Emorragica Ereditaria (HHT)

PREMESSA

- L'HHT è una patologia rara autosomica dominante che causa malformazioni vascolari in tutti gli organi.
- In particolare, le teleangectasie della mucosa nasale causano epistassi ricorrenti nel 96% dei pazienti
- Durante l'esecuzione del tampone nasale rinofaringeo per COVID 19 si potrebbe scatenare una massiccia epistassi con conseguente necessità di tamponamento nasale, intervento specializzato e ricovero.

RACCOMANDAZIONE

Nonostante una sensibilità diagnostica inferiore, **nei pazienti HHT è consigliabile eseguire un tampone orofaringeo** per valutare lo stato di infezione da COVID 19 in quanto, rispetto al rinofaringeo, espone a un rischio più basso di gravi trattamenti correlati alle epistassi, come trasfusioni di sangue o procedure invasive che vanno dal tamponamento nasale prolungato all'embolizzazione endovascolare.

Direttori Scientifici HHT Onlus

Fabio Pagella - Centro HHT San Matteo Pavia

Patrizia Suppressa - Centro HHT Policlinico di Bari